

【乳癌】

レジメン名称: ビノレルビン(乳癌)

インターバル日数: 21日 基準日: day1

催吐性リスク: 最小度

使用する抗がん剤:

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 | 投与 | ルート | 組織侵襲性 |
|----|------|-------|---------------------|-----|--------|-----|-------|
| 2 | 点滴静注 | ロゼウス注 | 25mg/m ² | | day1.8 | | 壊死性 |

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | day1 | day8 |
|----|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|
| 1 | 点滴静注 | 生理食塩液 100ml 点滴静注: ※点滴時間30分 ロゼウスを側管から投与 投与経路:末梢ルートメイン | 100ml | 投与順1 | 投与順1 |
| 2 | 点滴静注 | 生理食塩液 50ml 点滴静注: ※点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管 | 50ml | 投与順2 | 投与順2 |
| 3 | 点滴静注 | ロゼウス注 生理食塩液 50ml 点滴静注: ※点滴時間全開 投与経路:末梢ルートメイン側管 | 25mg/m ² 50ml | 投与順3 | 投与順3 |
| 4 | 点滴静注 | 生理食塩液 50ml 点滴静注: ※点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管 | 50ml | 投与順4 | 投与順4 |