

## 【泌尿器 腎細胞癌】

レジメン名称:オプジー+ヤーボイ(腎細胞癌)

インターバル日数:21日間 基準日:day1

催吐性リスク:最小度

## 使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
2	点滴静注	オプジー+ヤーボイ	240mg/body	—	day1	フィルター付き	非炎症性
4	点滴静注	ヤーボイ点滴静注液	1mg/kg	—	day1	フィルター付き	非炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	点滴静注	生理食塩液 100ml *点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1
2	点滴静注	オプジー+ヤーボイ 生理食塩液 100ml *点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	240mg/body 100ml	投与順2
3	点滴静注	生理食塩液 50ml *点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順3
4	点滴静注	ヤーボイ点滴静注液 生理食塩液 50ml *点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	1mg/kg 25ml	投与順4
5	点滴静注	生理食塩液 50ml *点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順5