

【泌尿器 腎細胞癌】

レジメン名称: バベンチオ+インライタ

インターバル日数: 14日間 基準日: day1

催吐性リスク: 最小度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
3	点滴静注	バベンチオ点滴静注	10mg/kg	—	day1	フィルター付き	非炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ポララミン注 5mg * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml 1A	投与順1
2	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順2
3	点滴静注	バベンチオ点滴静注 生理食塩液 250ml * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	10mg/kg 250ml	投与順3
4	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順4

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	
1	内服	アセトアミノフェン	500mg	点滴開始時に1錠服用
2	内服	インライタ	1日2回 1回5mg	連日服用