

【頭頸部癌】

レジメン名称: TPF

インターバル日数: 28 日

基準日: day 1

催吐性リスク: 高度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
4	点滴静注	ドセタキセル点滴静注	60mg/m <sup>2</sup>		day1	-	壊死性
7	点滴静注	シスプラチン点滴静注	60mg/m <sup>2</sup>		day1	-	炎症性
9	点滴静注	5-FU	600mg/m <sup>2</sup>		day1~5	-	炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5	day6
1	点滴静注	ブライメド点滴静注用150mg 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	iV 100ml	投与順1					
2	点滴静注	パロノセトロン静注0.75mg/5ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	0.75mg 6A 100ml	投与順2					
3	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	4A 100ml		投与順1	投与順1	投与順1		
4	点滴静注	ドセタキセル点滴静注 生理食塩液 250ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	60mg/m <sup>2</sup> 250ml	投与順3					
5	点滴静注	アスパラギン酸カリウム注10mEq/10ml 硫酸Mg補正液1mEq/ml 20ml ソルデム1 500ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	1A 0.4A 500ml	投与順4					
6	点滴静注	20%マンニトール300ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	200ml	投与順5					
7	点滴静注	シスプラチン点滴静注 生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間120分 投与経路:末梢ルートメイン	60mg/m <sup>2</sup> 計500ml	投与順6					
8	点滴静注	生理食塩液 500ml アスパラギン酸カリウム注10mEq/10ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	500ml 1A	投与順7					
9	点滴静注	生理食塩液 500ml 5-FU 点滴静注: * 点滴時間24時間 投与経路:末梢ルートメイン	500ml 600mg/m <sup>2</sup>	投与順8	投与順3	投与順3	投与順2	投与順1	
10	点滴静注	ソルアセトF 500ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	500ml	投与順9	投与順2	投与順2			
11	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml						投与順1