

【頭頸部癌】

レジメン名称: アービタックス+PF(初回)

催吐性リスク: 高度

インターバル日数: 21 日 基準日: day 1

★登録はインターバル7日

★day8、15のアービタックスはアービタックス単独レジメンを使用

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
4	点滴静注	アービタックス点滴静注	初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ²		day1、8、15	-	非炎症性
8	点滴静注	シスプラチン点滴静注	80mg/m ²		day1	-	炎症性
10	点滴静注	5-FU	800mg/m ²		day1~4	-	炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5
1	点滴静注	フロイメド点滴静注用150mg 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	1V 100ml	投与順1				
2	点滴静注	パロノセトロン静注0.75mg/5ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml ポララミン注5mg 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	0.75mg 6A 1A 100ml	投与順2				
3	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	4A 100ml		投与順1	投与順1	投与順1	
4	点滴静注	アービタックス点滴静注 生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間120分 投与経路:末梢ルートメイン	400mg/m ² 500ml	投与順3				
5	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順4				
6	点滴静注	アスパラギン酸カリウム注10mEq/10ml 硫酸Mg補正液1mEq/ml 20ml ソルデム1 500ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	1A 0.4A 500ml	投与順5				
7	点滴静注	20%マンニトール300ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	200ml	投与順6				
8	点滴静注	シスプラチン点滴静注 生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間120分 投与経路:末梢ルートメイン	80mg/m ² 計500ml	投与順7				
9	点滴静注	生理食塩液 500ml アスパラギン酸カリウム注10mEq/10ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	500ml 1A	投与順8				
10	点滴静注	生理食塩液 500ml 5-FU 点滴静注: * 点滴時間24時間 投与経路:末梢ルートメイン	500ml 800mg/m ²	投与順9	投与順3	投与順3	投与順2	
11	点滴静注	ソルアセトF 500ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	500ml	投与順10	投与順2	投与順2		
12	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml					投与順1