

【耳鼻科 頭頸部癌】

レジメン名称:アービタックス+パクリタキセル(初回)

インターバル日数:7日

基準日:day1

催吐性リスク:軽度

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
3	点滴静注	アービタックス注射用	初回400mg/m <sup>2</sup> 2回目以降250mg/m <sup>2</sup>	-	day1	-	非炎症性
6	点滴静注	パクリタキセル注	80mg/m <sup>2</sup>	-	day1	PVCフリー/フィルター付き	壊死性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml ボラミン注5mg 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	6A 1A 100ml	投与順1
2	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順2
3	点滴静注	アービタックス注射用 生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間 2時間 投与経路:末梢ルートメイン	400mg/m <sup>2</sup> 500ml	投与順3
4	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注: 開始後30分以内に側管から ファモチジン投与 * 点滴時間1時間 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順4
5	点滴静注	ファモチジン静注20mg/20ml 静注: パクリタキセル投与30分前までに投与 投与経路:末梢ルートメイン側管	1A	投与順5
6	点滴静注	パクリタキセル注 大塚糖液5% 250ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	80mg/m <sup>2</sup> 250ml	投与順6
7	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順7