## 【頭頸部癌】

レジメン名称:パクリタキセル1週間毎(頭頸部癌) 催吐性リスク:軽度

インターバル日数:49日

基準日:day 1

## 使用する抗癌剤:

Rр	手技	薬剤名称	標準値	投与	ルート	組織侵襲性
3	点滴静注	パクリタキセル注	100mg/ <b>m</b> ²	day1,8,15,22,29,36	PVCフリー/フィルター付き	壊死性

	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8	day15	day22	day29	day36
1	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml	4A	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1
		ファモチジン静注20mg/20ml	1A						
		ポララミン注5mg	1A						
		生理食塩液100ml	100ml						
		点滴静注:							
		* 点滴時間30分							
		投与経路:末梢ルートメイン							
2	点滴静注	生理食塩液 100ml	100ml	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2
		点滴静注:							
		* 点滴時間30分							
		投与経路:末梢ルートメイン							
3	点滴静注	パクリタキセル注	100mg/ <b>m</b> ²	投与順3	投与順3	投与順3	投与順3	投与順3	投与順3
		大塚糖液5% 250ml	250ml						
		点滴静注:							
		* 点滴時間60分							
		投与経路:末梢ルートメイン							
4	点滴静注	生理食塩液 50ml	50ml	投与順4	投与順4	投与順4	投与順4	投与順4	投与順4
		点滴静注:							
		* 点滴時間15分							
		投与経路:末梢ルートメイン							