【末梢性T細胞リンパ腫】

レジメン名称　:　ダルビアス　　インターバル日数　:　21　日

催吐性リスク　:　軽度　　基準日:day　1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
2	中心静脈注射	ダルビアス点滴静注用	300mg/㎡	－	day1～5	－	炎症性	

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5
1	中心静脈注射	生理食塩液　100ml 点滴静注 ＊点滴時間30分 投与経路:CVメインルート	100ml	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1
2	中心静脈注射	ダルビアス点滴静注用 注射用水　100ml 生理食塩液　250ml 135mg/Vを注射用水1.8mlで溶解(75mg/ml) 点滴静注 ＊点滴時間1時間 投与経路:CVメインルート	300mg/㎡ 必要量 250ml	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2
3	中心静脈注射	生理食塩液　50ml 点滴静注 ＊点滴時間5分 投与経路:CVメインルート	50ml	投与順3	投与順3	投与順3	投与順3	投与順3

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5
1	内服	ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg(1錠)	0.1mg(1錠)	0.1mg(1錠)	0.1mg(1錠)	0.1mg(1錠)	0.1mg(1錠)