

【小細胞肺癌】

レジメン名称: シスプラチン+エトポシド+イミフィンジ 催吐性リスク: 高度

インターバル日数: 21 日

基準日: day 1

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
2	点滴静注	イミフィンジ点滴静注	1500mg/body		day1	フィルター付き	非炎症性
10	点滴静注	シスプラチン点滴静注	75~80mg/m ²		day1	-	炎症性
8	点滴静注	エトポシド点滴静注液	80~100mg/m ²		day1.2.3	PVC7リ-	炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4
1	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間 30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1			
2	点滴静注	イミフィンジ点滴静注 生理食塩液 100ml 体重30kg以下の場合はイミフィンジ20mg/kgに変更 * 点滴時間 60分 投与経路:末梢ルートメイン	1500mg/body 100ml	投与順2			
3	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間 5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順3			
4	点滴静注	プロイメンド点滴静注用150mg 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	1V 100ml	投与順4			
5	点滴静注	パロノセトロン静注0.75mg/5ml デキササート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間15分 投与経路:末梢ルートメイン	1V 6A 50ml	投与順5			
6	点滴静注	デキササート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間15分 投与経路:末梢ルートメイン	4A 50ml	投与順1	投与順1	投与順1	
7	点滴静注	アスバラギン酸カリウム注10mEq/10ml 硫酸Mg補正液1mEq/ml20ml 生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	1A 0.4A 500ml	投与順6			
8	点滴静注	エトポシド点滴静注液 生理食塩液 500ml 80mg~100mg/m ² 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	100mg/m ² 500ml	投与順7	投与順2	投与順2	
9	点滴静注	20%マンニトール 300ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	200ml	投与順8			
10	点滴静注	シスプラチン点滴静注 生理食塩液 500ml 75~80mg/m ² 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	80mg/m ² 計500ml	投与順9			
11	点滴静注	アスバラギン酸カリウム注10mEq/10ml 生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	1A 500ml	投与順10			
12	点滴静注	生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴速度60分 投与経路:末梢ルートメイン	500ml	投与順11	投与順3	投与順3	
13	点滴静注	生理食塩液 20ml 点滴静注: 投与経路:末梢ルートメイン(ロック用)	20ml	投与順12	投与順4	投与順4	