

【急性リンパ性白血病】

レジメン名称 : ベスポンサ CR未

催吐性リスク : 最小度

インターバル日数 : 21 日

基準日: day1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
5	点滴静注	ベスポンサ点滴静注用	0.8mg/m <sup>2</sup>	-	day1	-	-
6	点滴静注	ベスポンサ点滴静注用	0.5mg/m <sup>2</sup>	-	day8、15	-	-

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8	day15
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注 ※点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1	投与順1	投与順1
2	点滴静注	ソルメドロール静注用125mg 生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間15分 投与経路:末梢ルートメイン	125mg 50ml	投与順2	投与順2	投与順2
3	点滴静注	ボラミン注5mg 生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間15分 投与経路:末梢ルートメイン	1A 50ml	投与順3	投与順3	投与順3
4	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注 ※点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順4	投与順4	投与順4
5	点滴静注	ベスポンサ点滴静注用 注射用水 20ml 生理食塩液 50ml 1mg/Vを4mlの注射用水で溶解(0.25mg/ml)、必要量を採取 遮光 点滴静注 ※点滴時間1時間 投与経路:末梢ルートメイン	0.8mg/m <sup>2</sup> 必要量 50ml	投与順5	-	-
6	点滴静注	ベスポンサ点滴静注用 注射用水 20ml 生理食塩液 50ml 1mg/Vを4mlの注射用水で溶解(0.25mg/ml)、必要量を採取 遮光 点滴静注 ※点滴時間1時間 投与経路:末梢ルートメイン	0.5mg/m <sup>2</sup> 必要量 50ml	-	投与順5	投与順5
7	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン		投与順6	投与順6	投与順6

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8	day15
1	内服	アセトアミノフェン錠	400mg	400mg	400mg	400mg