

【胃癌】

レジメン名称: XELOX(胃癌)
 催吐性リスク: 中等度

インターバル日数: 21日

基準日: day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
3	中心静脈注射	エルプラット点滴静注液	130mg/m ²		day1	-	壊死性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	中心静脈注射	プロイメンド点滴静注用150mg 生理食塩液 100ml 中心静脈注射: * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン	1V 100ml	投与順1
2	中心静脈注射	デキサート注射液1.65mg/0.5ml グラニセトロン点滴静注3mg/100ml 中心静脈注射: * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン	4A 1P	投与順2
3	中心静脈注射	エルプラット点滴静注液 大塚糖液 5% 250ml 中心静脈注射: ※点滴時間120分 投与経路:CVルートメイン	130mg/m ² 250ml	投与順3
4	中心静脈注射	生理食塩液 50ml 中心静脈注射: ※点滴時間5分 投与経路:CVルートメイン	50ml	投与順4

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4
1	内服	デカドロン	4mg		4mg	4mg	4mg
2	内服	ゼローダ	2000mg/m ²	day1夕～day15朝			