

【胃癌】

レジメン名称: ハーセプチン+XELOX(2回目以降)
 催吐性リスク: 中等度

インターバル日数: 21日 基準日: day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
3	点滴静注	ハーセプチン点滴静注用	6mg/kg	-	day1	-	非炎症性
6	点滴静注	エルプラット点滴静注液	130mg/m ²	-	day1	-	壊死性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1
2	点滴静注	ハーセプチン点滴静注用 注射用水 20ml 生理食塩液 250ml 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	6mg/kg 必要量 250ml	投与順2
3	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順3
4	点滴静注	プロイメンド点滴静注用150mg 生理食塩液 100ml 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	1V 100ml	投与順4
5	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml グラニセトロン点滴静注3mg/100ml 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	4A 1P	投与順5
6	点滴静注	エルプラット点滴静注液 大塚糖液 5% 250ml 点滴静注 ※点滴時間120分 投与経路:末梢ルートメイン	130mg/m ² 250ml	投与順6
7	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順7

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4
1	内服	デカドロン	4mg		4mg	4mg	4mg
2	内服	ゼローダ	2000mg/m ²	day1夕~day15朝			