

【胃癌】

レジメン名称: ハーセプチン+ゼローダ+シスプラチン(2回目以降)
 催吐性リスク: 高度

インターバル日数: 21 日

基準日: day 1

使用する抗癌剤:

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 | 投与 | ルート | 組織侵襲性 |
|----|------|------------|-----------------------------|-----|------|-----|-------|
| 4 | 点滴静注 | ハーセプチン注射用 | 初回8mg/kg 2回目以降 6mg/kg | | day1 | - | 非炎症性 |
| 7 | 点滴静注 | シスプラチン点滴静注 | 80mg/m ² | | day1 | - | 炎症性 |

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | day1 | day2 | day3 | day4 |
|----|------|--|-------------------------------|-------|------|------|------|
| 1 | 点滴静注 | プロイメンド点滴静注用150mg 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン | 1V 100ml | 投与順1 | | | |
| 2 | 点滴静注 | パロノセトロン静注0.75mg/5ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間15分 投与経路:末梢ルートメイン | 0.75mg 6A 50ml | 投与順2 | | | |
| 3 | 点滴静注 | アスパラギン酸カリウム注10mEq/10ml 硫酸Mg補正液1mEq/ml20ml 生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン | 1A 0.4A 500ml | 投与順3 | | | |
| 4 | 点滴静注 | ハーセプチン注射用 注射用水 20ml 生理食塩液 250ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン | 6mg/kg 必要量 250ml | 投与順4 | | | |
| 5 | 点滴静注 | 生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン | 500ml | 投与順5 | | | |
| 6 | 点滴静注 | 20%マンニトール 300ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン | 200ml | 投与順6 | | | |
| 7 | 点滴静注 | シスプラチン点滴静注 生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間120分 投与経路:末梢ルートメイン | 80mg/m ² 計500ml | 投与順7 | | | |
| 8 | 点滴静注 | 生理食塩液 500ml アスパラギン酸カリウム注10mEq/10ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン | 500ml 1A | 投与順8 | | | |
| 9 | 点滴静注 | 生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴速度60分 投与経路:末梢ルートメイン | 500ml | 投与順9 | | | |
| 10 | 点滴静注 | ソルアセトF 500ml 点滴静注: * 点滴速度60分 投与経路:末梢ルートメイン | 500ml | | 投与順1 | 投与順1 | |
| 11 | 点滴静注 | ソルアセトF 500ml 点滴静注: * 点滴速度60分 投与経路:末梢ルートメイン | 500ml | | 投与順2 | 投与順2 | |
| 12 | 点滴静注 | 生理食塩液 20ml 点滴静注: 投与経路:末梢ルートメイン(ロック用) | 20ml | 投与順10 | 投与順3 | | |

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | day1 | day2 | day3 | day4 |
|----|----|-------|-----------------------|--------------|------|------|------|
| 1 | 内服 | デカドロン | 8mg | | 8mg | 8mg | 8mg |
| 2 | 内服 | ゼローダ | 2000mg/m ² | day1夕~day15朝 | | | |