

【急性リンパ性白血病、悪性リンパ腫】

レジメン名称 : HyperCVAD
 催吐性リスク : 高度

★HyperCVDA/MA療法
 大量MTX+AraCと交互に4コース

インターバル日数 14日
 基準日: day1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
2	中心静脈注射	デキサート注射液1.65mg	33mg(20A)/body	-	day1~4 day11~14	-	-	-
4、6	中心静脈注射	注射用エンドキサン	1回300mg/m ² 、1日2回12時間毎	-	day1、2、3	-	炎症性	-
8	中心静脈注射	オンコビン注	2mg/body	2mg	day4、11	-	壊死性	-
9	中心静脈注射	ドキシソルピシン塩酸塩注射液	50mg/m ²	-	day4	-	壊死性	500mg/m ²

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day11	day12	day13	day14
1	中心静脈注射	パロノセトロン静注0.75mg/5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注 *点滴時間30分 投与経路:中心静脈メイン	1V 100ml	投与順1							
2	中心静脈注射	デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml *点滴時間30分 投与経路:中心静脈メイン	20A 100ml	投与順2	投与順1	投与順1	投与順2	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1
3	中心静脈注射	大塚糖液 5% 500ml 点滴静注 ※点滴時間24時間 投与経路:中心静脈メイン	500ml	投与順3	投与順2	投与順2	投与順1				
4	中心静脈注射	注射用エンドキサン 生理食塩液 500ml 1日2回12時間毎(指示された時間に投与) 点滴静注 ※点滴時間2時間 投与経路:中心静脈メイン	300mg/m ² 500ml	投与順4	投与順3	投与順3					
5	中心静脈注射	生理食塩液50ml 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路:中心静脈メイン	50ml	投与順5	投与順4	投与順4					
6	中心静脈注射	注射用エンドキサン 生理食塩液 500ml 1日2回12時間毎(指示された時間に投与) 点滴静注 ※点滴時間2時間 投与経路:中心静脈メイン	300mg/m ² 500ml	投与順6	投与順5	投与順5					
7	中心静脈注射	生理食塩液50ml 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路:中心静脈メイン	50ml	投与順7	投与順6	投与順6					
8	中心静脈注射	オンコビン注 生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間10分 投与経路:中心静脈メイン	2mg/body 50ml				投与順3	投与順2			
9	中心静脈注射	ドキシソルピシン塩酸塩注射液 生理食塩液 500ml 点滴静注 ※点滴時間24時間 投与経路:中心静脈メイン	50mg/m ² 500ml				投与順4				
10	中心静脈注射	生理食塩液 50ml 点滴静注 *点滴時間5分 投与経路:中心静脈メイン	50ml					投与順3			

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3
1	内服	イメドカプセル	125mg、80mg	125mg	80mg	80mg