

【悪性リンパ腫】

レジメン名称 : DA-EPOCH-R
 催吐性リスク : 高度

インターバル日数 : 21 日
 基準日 : day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
4	中心静脈注射	リツキシマブBS点滴静注	375mg/m ²	-	day1	-	非炎症性	-
9	中心静脈注射	エトボシド点滴静注液	50mg/m ²	-	day1~4	PVC7リ-	炎症性	-
10	中心静脈注射	オンコピン注	0.4mg/m ²	2mg	day1~4	-	壊死性	-
10	中心静脈注射	ドキシソルピシン塩酸塩注射液	10mg/m ²	-	day1~4	-	壊死性	500mg/m ²
11	中心静脈注射	注射用エンドキサン	750mg/m ²	-	day5	-	炎症性	-

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5
1	中心静脈注射	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注 ※点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン	100ml	投与順1	-	-	-	投与順2
2	中心静脈注射	ボラミン注5mg/1ml ワンショットで 静注 投与経路:CVルート側管	1A	投与順2	-	-	-	-
3	中心静脈注射	ソルメドロール静注125mg 生理食塩液 100ml 点滴静注 ※点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン	125mg 100ml	投与順3	-	-	-	-
4	中心静脈注射	リツキシマブBS点滴静注 生理食塩液 1000ml 10倍希釈になるように調製 点滴静注 ※点滴時間は主治医入力 投与経路:CVルートメイン	375mg/m ² 10倍希釈になる量 (主治医入力)	投与順4	-	-	-	-
5	中心静脈注射	生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路:CVルートメイン	50ml	投与順5	-	-	-	投与順4
6	中心静脈注射	パロノセトロン静注0.75mg 生理食塩液 100ml 点滴静注 ※点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン	1V 100ml	投与順6	-	-	-	-
7	中心静脈注射	生理食塩液 100ml 点滴静注 ※点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン	100ml	投与順7	-	-	-	-
8	中心静脈注射	生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路:CVルート側管	50ml	投与順8	-	-	-	投与順1
9	中心静脈注射	エトボシド点滴静注液 5%糖液 500ml オンコピン、ドキシソルピシンと同時に 点滴静注 ※点滴時間24時間 投与経路:CVルートメイン	50mg/m ² 500ml	投与順9	投与順1	投与順1	投与順1	-
10	中心静脈注射	オンコピン注 ドキシソルピシン塩酸塩注射液 生理食塩液 500ml エトボシドと同時に 点滴静注 ※点滴時間24時間 投与経路:CVルート側管	0.4mg/m ² 10mg/m ² 500ml	投与順10	投与順2	投与順2	投与順2	-
11	中心静脈注射	注射用エンドキサン 生理食塩液 500ml 点滴静注 ※点滴時間2時間 投与経路:CVルートメイン	750mg/m ² 500ml	-	-	-	-	投与順3

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5
1	内服	イメンドカプセル	125mg、80mg	125mg	80mg	80mg	-	-
2	内服	ブレドニゾロン錠5mg	60mg/m ² ~120mg/m ²	day1~5				