

【悪性リンパ腫】

レジメン名称 : DeVIC
 催吐性リスク : 中等度

インターバル日数 : 21 日
 基準日 : day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
2	点滴静注	デキササート注射液1.65mg	33mg(20A)/body	-	day1、2、3	-	-	-
4	点滴静注	カルボプラチン点滴静注液	300mg/m ²	-	day1	-	炎症性	-
5	点滴静注	エトポシド点滴静注液	100mg/m ²	-	day1、2、3	PVCフリー	炎症性	-
7	点滴静注	注射用イホマイド	1.5g/m ²	-	day1、2、3	-	炎症性	-

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3
1	点滴静注	グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100ml 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1	投与順1	投与順1
2	点滴静注	デキササート注射液1.65mg 生理食塩液 100ml 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	20A 100ml	投与順2	投与順2	投与順2
3	点滴静注	生理食塩液 250ml ルートキープ用 点滴静注 投与経路:末梢ルートメイン	250ml	投与順3	投与順3	投与順3
4	点滴静注	カルボプラチン点滴静注液 5%糖液 500ml 点滴静注 * 点滴時間1時間 投与経路:末梢ルートメイン	300mg/m ² 500ml	投与順4	-	-
5	点滴静注	エトポシド点滴静注液 生理食塩液 500ml 点滴静注 * 点滴時間2時間 投与経路:末梢ルートメイン	100mg/m ² 500ml	投与順5	投与順4	投与順4
6	静注	ウロミテキサン注 生理食塩液 20ml イホマイド1日量の20%量 イホマイド投与直前 静注 投与経路:末梢ルート側管	イホマイド1日量の20%量 20ml	投与順6	投与順5	投与順5
7	点滴静注	注射用イホマイド 生理食塩液 500ml 点滴静注 * 点滴時間2時間 投与経路:末梢ルートメイン	1.5g/m ² 500ml	投与順7	投与順6	投与順6
8	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順8	投与順7	投与順7
9	静注	ウロミテキサン注 生理食塩液 20ml イホマイド1日量の20%量 イホマイド投与4時間後 静注 投与経路:末梢ルート側管	イホマイド1日量の20%量 20ml	投与順9	投与順8	投与順8
10	静注	ウロミテキサン注 生理食塩液 20ml イホマイド1日量の20%量 イホマイド投与8時間後 静注 投与経路:末梢ルート側管	イホマイド1日量の20%量 20ml	投与順10	投与順9	投与順9

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3
1	内服	イメンドカプセル	125mg、80mg	125mg	80mg	80mg