

【成人T細胞白血病リンパ腫】

レジメン名称 : mLSG15 day1 (VCAP)

催吐性リスク : 中等度

インターバル日数 :

28 日

★登録はインターバル1日

基準日: day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
2	点滴静注	オンコビン注	1mg/m ²	2mg	day1	-	壊死性	-
3	点滴静注	ドキソルビシン塩酸塩注射液	40mg/m ²	-	day1	-	壊死性	500mg/m ²
4	点滴静注	注射用エンドキサン	350mg/m ²	-	day1	-	炎症性	-
1	内服	プレドニゾロン錠5mg	40mg/m ²	-	day1	-	-	-

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	点滴静注	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100ml 点滴静注 ※点滴時間15分 投与経路:末梢ルートメイン	1P	投与順1
2	点滴静注	オンコビン注 生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	1mg/m ² 50ml	投与順2
3	点滴静注	ドキソルビシン塩酸塩注射液 生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	40mg/m ² 計50ml	投与順3
4	点滴静注	注射用エンドキサン 生理食塩液 500ml 点滴静注 ※点滴時間2時間 投与経路:末梢ルートメイン	350mg/m ² 500ml	投与順4
5	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順5

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3
1	内服	プレドニゾロン錠5mg	40mg/m ²	40mg/m ²	-	-
2	内服	イメンドカプセル	125mg、80mg	125mg	80mg	80mg

- ★ ホテリジオを併用するときは
1サイクルはday2～5の間
2～4サイクルはday-3～-1の間に投与