

【成人T細胞白血病リンパ腫】

レジメン名称 : mLSG15 day8 (AMP)

催吐性リスク : 中等度

インターバル日数 :

28 日

★登録はインターバル1日

基準日 : day 1

★登録はday8をday1とする

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
2	点滴静注	ドキソルビシン塩酸塩注射液	30mg/m <sup>2</sup>	-	day8	-	壊死性	500mg/m <sup>2</sup>
3	点滴静注	注射用サイメリン	60mg/m <sup>2</sup>	-	day8	-	壊死性	-
1	内服	プレドニゾロン錠5mg	40mg/m <sup>2</sup>	-	day8	-	-	-

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day8
1	点滴静注	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100ml 点滴静注 ※点滴時間15分 投与経路:末梢ルートメイン	1P	投与順1
2	点滴静注	ドキソルビシン塩酸塩注射液 生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	30mg/m <sup>2</sup> 計50ml	投与順2
3	点滴静注	注射用サイメリン 生理食塩液 100ml 遮光 点滴静注 ※点滴時間1時間 投与経路:末梢ルートメイン	60mg/m <sup>2</sup> 100ml	投与順3
4	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順4

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day8
1	内服	プレドニゾロン錠5mg	40mg/m <sup>2</sup>	40mg/m <sup>2</sup>
2	内服	イメンドカプセル125mg	125mg	125mg