

【中枢神経原発性リンパ腫】

レジメン名称 : MPV療法(PCNSL寛解導入)  
 催吐性リスク : 高度

インターバル日数  
 基準日 :

14日  
 day1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
7	点滴静注	メソトレキセート注射用1g	3.5g/m <sup>2</sup>	-	day1	-	非炎症性	-
8	点滴静注	オンコピン注射用1mg	1.4mg/m <sup>2</sup>	2mg	day1	-	壊死性	-
2	内服	プロカルバジン	100mg/m <sup>2</sup>	-	day1~7(奇数サイクル)	-	-	-

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4
1	点滴静注	ソルデム3A500ml メイロン静注7%20ml 点滴静注 *点滴時間6時間(0:00~6:00) 投与経路:末梢ルートメイン	500ml 40ml	投与順1	投与順1	投与順1 ロイコリン(4:00) を側管から投与	
2	点滴静注	ソルデム3A500ml メイロン静注7%20ml 点滴静注 *点滴時間6時間(6:00~12:00) 投与経路:末梢ルートメイン	500ml 40ml	投与順2 ハロ/セトロン(9:30) メソトレキセート(10:00) を側管から投与	投与順2 ロイコリン(10:00) を側管から投与	投与順3 ロイコリン(10:00) を側管から投与	
3	点滴静注	ソルデム3A500ml メイロン静注7%20ml 点滴静注 *点滴時間6時間(12:00~18:00) 投与経路:末梢ルートメイン	500ml 40ml	投与順5 オンコピン(13:00) を側管から投与	投与順4 ロイコリン(16:00) を側管から投与	投与順5 ロイコリン(16:00) を側管から投与	
4	点滴静注	ソルデム3A500ml メイロン静注7%20ml 点滴静注 *点滴時間6時間(18:00~24:00) 投与経路:末梢ルートメイン	500ml 40ml	投与順7	投与順6 ロイコリン(22:00) を側管から投与	投与順7 ロイコリン(22:00) を側管から投与	
5	点滴静注	ソルデム3A500ml 点滴静注 *点滴時間24時間(0:00~24:00) 投与経路:末梢ルートメイン	500ml				投与順1 ロイコリン(4:00, 10:00, 16:00, 22:00) を側管から投与
6	点滴静注	ハロノセトロン静注0.75mg/5ml 生理食塩液50ml 点滴静注 *点滴時間30分(9:30~10:00) 投与経路:末梢ルート側管	1V 50ml	投与順3			
7	点滴静注	メソトレキセート注射用1g/40ml 生理食塩液500ml 計500mlになるように調整 点滴静注 *点滴時間3時間(10:00~13:00) 投与経路:末梢ルート側管	3.5g/m <sup>2</sup> 計500ml	投与順4			
8	点滴静注	オンコピン注射用1mg 生理食塩液50ml 点滴静注 *点滴時間15分(13:00~13:15) 投与経路:末梢ルート側管	1.4mg/m <sup>2</sup> 50ml	投与順6			
9	点滴静注	ロイコリン注3mg/1ml 生理食塩液50ml 点滴静注 *点滴時間15分 投与経路:末梢ルート側管	20A 50ml		投与順3 (10:00~10:15)		
10	点滴静注	ロイコリン注3mg/1ml 生理食塩液50ml 点滴静注 *点滴時間15分 投与経路:末梢ルート側管	5A 50ml			投与順2 (4:00~4:15)	投与順2 (4:00~4:15)
11	点滴静注	ロイコリン注3mg/1ml 生理食塩液50ml 点滴静注 *点滴時間15分 投与経路:末梢ルート側管	5A 50ml			投与順4 (10:00~10:15)	投与順3 (10:00~10:15)
12	点滴静注	ロイコリン注3mg/1ml 生理食塩液50ml 点滴静注 *点滴時間15分 投与経路:末梢ルート側管	5A 50ml		投与順5 (16:00~16:15)	投与順6 (16:00~16:15)	投与順4 (16:00~16:15)
13	点滴静注	ロイコリン注3mg/1ml 生理食塩液50ml 点滴静注 *点滴時間15分 投与経路:末梢ルート側管	5A 50ml		投与順7 (22:00~22:15)	投与順8 (22:00~22:15)	投与順5 (22:00~22:15)

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3
1	内服	イメドカプセル	125mg、80mg	125mg	80mg	80mg
2	内服	プロカルバジン	100mg/m <sup>2</sup>		day1~7(奇数サイクル)	

★MTX濃度危険限界

24時間値(day2 10:00)  $1 \times 10^{-5}$ モル濃度  
 48時間値(day3 10:00)  $1 \times 10^{-6}$ モル濃度  
 72時間値(day4 10:00)  $1 \times 10^{-7}$ モル濃度

★ロイコリンはメソトレキセート開始後24時間後から6時間毎投与

★プロカルバジン:50~100mgは1~2回に分割、150~300mgは3回に分割して投与