

【悪性リンパ腫】

レジメン名称 : Pola+R-CHP1日
 催吐性リスク : 高度

インターバル日数 : 21 日
 基準日 : day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
4	点滴静注	リツキシマブBS点滴静注	375mg/m ²		day1		非炎症性	
8	点滴静注	ポライビー点滴静注用	1.8mg/kg		day1	フィルター付き	非炎症性	
10	点滴静注	注射用エンドキサン	750mg/m ²		day1		炎症性	
11	点滴静注	ドキシソルピシン塩酸塩注射液	50mg/m ²		day1		壊死性	500mg/m ²

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	点滴静注	生理食塩液100ml ルートキープ用 ポラミンを側管から投与 点滴静注 *点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1
2	静注	ポラミン注5mg/1ml ワンショットで 静注 投与経路:末梢ルートメイン側管	1A	投与順2
3	点滴静注	ソルメドロール静注125mg 生理食塩液 100ml 点滴静注 ※点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	125mg 100ml	投与順3
4	点滴静注	リツキシマブBS点滴静注 生理食塩液 1000ml 10倍希釈になるように調製 点滴静注 ※点滴時間は主治医入力 投与経路:末梢ルートメイン	375mg/m ² 10倍希釈になる量 (主治医入力)	投与順4
5	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順5
6	点滴静注	ハロノセトロン静注0.75mg 生理食塩液100ml 点滴静注 *点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	1V 100ml	投与順6
7	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順7
8	点滴静注	ポライビー点滴静注用 30mg/Vは1.8ml、140mg/Vは7.2mlで溶解 注射用水20ml 生理食塩液 100ml 0.72mg/ml~2.7mg/ml 72mg未満は生食50mlに変更 点滴静注 *点滴時間初回90分、2回目以降30分 投与経路:末梢ルートメイン	1.8mg/kg (20mg/m) 必要量 100ml	投与順8
9	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順9
10	点滴静注	注射用エンドキサン 生理食塩液 500ml 点滴静注 ※点滴時間2時間 投与経路:末梢ルートメイン	750mg/m ² 500ml	投与順10
11	点滴静注	ドキシソルピシン塩酸塩注射液 生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50mg/m ² 計50ml	投与順11
12	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順12

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5
1	内服	イメドカプセル	125mg、80mg	125mg	80mg	80mg		
2	内服	プレドニゾン錠5mg	100mg/body			day2~5	100mg/body	