

【泌尿器 精巣癌】

レジメン名称: BEP 催吐性リスク: 高度

インターバル日数: 28日 基準日: day1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
5	点滴静注	シスプラチン点滴静注	20mg/m <sup>2</sup>		day1.2.3.4.5		炎症性	
8	点滴静注	エトポシド点滴静注液	100mg/m <sup>2</sup>		day1.2.3.4.5	PVCフリー	炎症性	
9	皮下注射	ブレオ注射用	20mg/m <sup>2</sup>	30mg/body	day2.9.16		炎症性	360mg

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5	day9	day16
1	点滴静注	生理食塩液 500ml 点滴静注: ※点滴時間3時間(9:00~12:00) 投与経路:末梢ルートメイン	500ml	投与順1						
1	点滴静注	ソルアセトD 500ml 点滴静注: ※点滴時間3時間(9:00~12:00) 投与経路:末梢ルートメイン	500ml	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1		
2	点滴静注	プロイメンド点滴静注用150mg 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分(9:00~9:30) 投与経路:末梢ルートメイン側管	1V 100ml	投与順2						
3	点滴静注	パロノセトロン静注0.75mg/5ml デキササート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: ※点滴時間30分(9:30~10:00) 投与経路:末梢ルートメイン側管	0.75mg 6A 100ml	投与順3						
4	点滴静注	マンニゲン注20% 200ml 点滴静注: ※点滴時間20分(10:00~10:20) 投与経路:末梢ルートメイン側管	200ml	投与順4	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2		
5	点滴静注	シスプラチン点滴静注 生理食塩液 500ml 点滴静注: ※点滴時間3時間(10:20~13:20) 投与経路:末梢ルートメイン側管	20mg/m <sup>2</sup> 500ml	投与順5	投与順3	投与順3	投与順3	投与順3		
6	点滴静注	ソルアセトD 500ml 点滴静注: ※点滴時間5時間(12:00~17:00) 投与経路:末梢ルートメイン	500ml	投与順6	投与順4	投与順4	投与順4	投与順4		
7	点滴静注	マンニゲン注20% 200ml 点滴静注: ※点滴時間20分(13:20~13:40) 投与経路:末梢ルートメイン側管	200ml	投与順7	投与順5	投与順5	投与順5	投与順5		
8	点滴静注	エトポシド点滴静注液 生理食塩液 500ml 点滴静注: ※点滴時間3時間(13:40~16:40) 投与経路:末梢ルートメイン側管	100mg/m <sup>2</sup> 500ml	投与順8	投与順6	投与順6	投与順6	投与順6		
9	皮下注射	ブレオ注射用 生理食塩液 20ml 持続皮下注: ※点滴時間0.5ml/時(9:00~) 投与経路:末梢	20mg/m <sup>2</sup> 10ml		投与順7				投与順1	投与順1

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4
1	内服	デカドロン	8mg		8mg	8mg	8mg