

【多発性骨髄腫】

レジメン名称 : DKd(3~6サイクル)
 催吐性リスク 軽度

インターバル日数 : 28 日
 基準日 day1

使用する抗がん剤:

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 | 投与 | ルート | 組織侵襲性 |
|----|------|-------------|---------------------|-----|-------------------------|-----|-------|
| 4 | 皮下注 | ダラキューロ配合皮下注 | 1800mg/body | - | day1、15 | - | 非炎症性 |
| 2 | 点滴静注 | カイプロリス点滴静注用 | 56mg/m ² | - | day 1、2 8、9 15、16 | - | 非炎症性 |
| 3 | 内服 | レナデックス錠4mg | 20mg/body | - | day 1、2 8、9 15、16 | - | - |
| | | | 40mg/body | - | day22 | - | - |

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | day1 | day2 | day8 | day9 | day15 | day16 | day22 |
|----|------|---|---|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 1 | 点滴静注 | 生理食塩液 100ml 点滴静注 ※点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン | 100ml | 投与順1 | 投与順1 | 投与順1 | 投与順1 | 投与順1 | 投与順1 | |
| 2 | 点滴静注 | カイプロリス点滴静注用 注射用水 100ml 大塚糖液 5% 100ml 10mg/Vは注射用水5mlで溶解 40mg/Vは注射用水20mlで溶解 (2mg/ml) * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン | 56mg/m ² 2mg/mlになる量 50ml | 投与順2 | 投与順2 | 投与順2 | 投与順2 | 投与順2 | 投与順2 | |
| 3 | 点滴静注 | 生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン | 50ml | 投与順3 | 投与順3 | 投与順3 | 投与順3 | 投与順3 | 投与順3 | |
| 4 | 皮下注 | ダラキューロ配合皮下注 翼状針使用のため15.5mlで調製 皮下投与 | 1800mg/body | 投与順4 | | | | 投与順4 | | |

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | day1 | day2 | day8 | day9 | day15 | day16 | day22 |
|----|----|-----------------|--------|--------|------|------|------|--------|-------|-------|
| 1 | 内服 | アセトアミノフェン錠500mg | 1000mg | 1000mg | | | | 1000mg | | |
| 2 | 内服 | ポラミン錠2mg | 2mg | 2mg | | | | 2mg | | |
| 3 | 内服 | レナデックス錠4mg | 20mg | 20mg | 20mg | 20mg | 20mg | 20mg | 20mg | |
| | | | 40mg | | | | | | | |

- ★ アセトアミノフェン、ポラミン、レナデックスはダラキューロの投与1時間以上前に投与
- ★ レナデックスはカイプロリスの投与30分以上前に投与
- ★ 輸血時の間接クームス試験に影響あり
- ★ 高齢者ではレナデックスの減量を考慮