【多発性骨髄腫】
レジメン名称　：Kd（2ｺｰｽ目以降）　　インターバル日数　：　28　日
催吐性リスク　軽度　　day1

使用する抗がん剤：

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
2	点滴静注	カイプロリス点滴静注用	56mg/㎡	－	day 1、2 8、9 15、16	－	非炎症性
1	内服	レナデックス錠4mg	20mg/body	－	day 1、2 8、9 15、16 22、23	－	－

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day8	day9	day15	day16
1	点滴静注	生理食塩液　500ml ＊点滴時間2時間 投与経路:末梢ルートメイン	500ml	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1
2	点滴静注	カイプロリス点滴静注用 注射用水　100ml 大塚糖液　5%　100ml 蒸留水で溶解（2mg/ml）、必要量を採取 ＊点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	56mg/㎡ 2mg/mlになる量 50ml	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2
3	点滴静注	生理食塩液　500ml ＊点滴時間2時間 投与経路:末梢ルートメイン	500ml	投与順3	投与順3	投与順3	投与順3	投与順3	投与順3

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day8	day9	day15	day16
1	内服	レナデックス錠4mg	20mg	20mg	20mg	20mg	20mg	20mg	20mg

day22	day23
20mg	20mg