

【多発性骨髄腫】

レジメン名称 : VRD Lite (寛解導入:1~9サイクル)

催吐性リスク : 軽度

インターバル日数 : 35日

基準日 : day1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
1	皮下注	ボルテゾミブ注射用	1.3mg/m <sup>2</sup>	-	day1、8、15、22	-	非炎症性
2	内服	レナデックス錠4mg	20mg/body	-	day1、2      day8、9 day15、16    day22、23	-	-
3	内服	レブラミドカプセル5mg	15mg/body	-	day1~21	-	-

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8	day15	day22
1	皮下注	ボルテゾミブ注射用 生理食塩液 3mg/Vを1.2mlで溶解(2.5mg/ml)、必要量を採取 皮下投与	1.3mg/m <sup>2</sup>	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1、2	day8、9	day15、16	day22、23
2	内服	レナデックス錠4mg	20mg	20mg	20mg	20mg	20mg
3	内服	レブラミドカプセル5mg	15mg	day1~21			

★75歳超ではレナデックスはday1,8,15,22