

【肺癌】

レジメン名称: アブラキサン+ゲムシタビン

インターバル日数: 28日間 基準日: day1

催吐性リスク: 中等度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
3	点滴静注	アブラキサン点滴静注用	125mg/m <sup>2</sup>	—	day1、8、15	フィルター禁止	壊死性
5	点滴静注	ゲムシタビン点滴静注用	1000mg/m <sup>2</sup>	—	day1、8、15		炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8	day15
1	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml パロノセトロン静注用 0.75mg/5ml 生理食塩液 100ml * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	6A 1V 100ml	投与順1	投与順1	投与順1
2	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順2	投与順2	投与順2
3	点滴静注	アブラキサン点滴静注用 生理食塩液 50ml * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	125mg/m <sup>2</sup> 1Vあたり20ml (100mg/20ml)	投与順3	投与順3	投与順3
4	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順4	投与順4	投与順4
5	点滴静注	ゲムシタビン点滴静注用 生理食塩液 100ml * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	1000mg/m <sup>2</sup> 100ml	投与順5	投与順5	投与順5
6	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順6	投与順6	投与順6