

【大腸癌】

レジメン名称 : XELOX+アバスタチン(3週間毎)
 催吐リスク : 中程度

インターバル日数 : 21 日
 基準日 : day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート
3	中心静脈注射	アバスタチン点滴静注用		7.5mg/kg	day1	-
4	中心静脈注射	エルプラット点滴静注液		130mg/m ²	day1	-

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	中心静脈注射	プロイメンド点滴静注用150mg 生理食塩液 100ml 中心静脈注射: * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン	1V 100ml	投与順1
2	中心静脈注射	デキサート注射液1.65mg/0.5ml グラニセロン点滴静注3mg/100ml 中心静脈注射: * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン	4A 1P	投与順2
3	中心静脈注射	アバスタチン点滴静注用 生理食塩液 100ml 中心静脈注射: ※点滴時間 初回90分 2回目60分 3回目以降30分 投与経路:CVルートメイン	7.5mg/kg 100ml	投与順3
4	中心静脈注射	エルプラット点滴静注液 大塚糖液 5% 250ml 中心静脈注射: ※点滴時間120分 投与経路:CVルートメイン	130mg/m ² 250ml	投与順4
5	中心静脈注射	生理食塩液 50ml 中心静脈注射: ※点滴時間5分 投与経路:CVルートメイン	50ml	投与順5

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3
1	内服	デカドロン	4mg		4mg	4mg
2	内服	ゼローダ	2000mg/m ²		day1夕~day15朝	

組織侵襲性
非炎症性
壊死性

day4
4mg