

【胆道癌】

レジメン名称:ゲムシタビン+シスプラチン
 催吐性リスク:中等度

インターバル日数:21日 基準日:day1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
5	点滴静注	ゲムシタビン点滴静注用	1000mg/m ²		day1.8	—	炎症性
4	点滴静注	シスプラチン点滴静注	25mg/m ²		day1.8	—	炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8
1	点滴静注	生理食塩液1000ml 点滴静注: *点滴時間3時間 投与経路:末梢ルートメイン	1000ml	投与順1	投与順1
2	点滴静注	ブロイメド点滴静注用150mg 生理食塩液 100ml 点滴静注: *点滴時間30分 側管の1本目 投与経路:末梢ルートメイン側管	1V 100ml	投与順2	投与順2
3	点滴静注	パロノセトロン静注0.75mg/5ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: ※点滴時間30分 側管の2本目 投与経路:末梢ルートメイン側管	0.75mg 4A 100ml	投与順3	投与順3
4	点滴静注	シスプラチン点滴静注 生理食塩液 500ml 点滴静注: ※点滴時間1時間 側管の3本目 投与経路:末梢ルートメイン側管	25mg/m ² 500ml	投与順4	投与順4
5	点滴静注	ゲムシタビン点滴静注用 生理食塩液 100ml 点滴静注: ※点滴時間30分 側管の4本目 投与経路:末梢ルートメイン側管	1000mg/m ² 100ml	投与順5	投与順5
6	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: ※点滴時間5分 側管の5本目 リンス用 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順6	投与順6