

【悪性リンパ腫】

レジメン名称 : ガザイバ維持
 催吐性リスク : 最小度

インターバル日数 : 2ヵ月 ★登録は21日
 基準日 : day1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
3	点滴静注	ガザイバ点滴静注	1000mg/body	-	day1	フィルター付き	非壊死性	-

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1
2	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	100ml	投与順2
3	点滴静注	ガザイバ点滴静注 生理食塩液 250ml 点滴静注 ※点滴時間は主治医入力 投与経路:末梢ルートメイン側管	1000mg/body 計250ml	投与順3
4	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順4

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	内服	アセトアミノフェン錠	1000mg	1000mg
2	内服	ポララミン錠	2mg	2mg
3	内服	デカドロン錠	20mg	20mg

★ アセトアミノフェン、ポララミン、デカドロンはガザイバ投与開始の60分前に服用