

【胃癌】

レジメン名称:ハーセプチン+mFOLFOX6(2回目以降インターバル日数:42日 基準日:day 1
 催吐性リスク:中程度

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
2	中心静脈注射	ハーセプチン点滴静注用	6mg/kg	-	day1、22	-	非炎症性
7	中心静脈注射	エルブラット点滴静注液	85mg/m ²	-	day1、15、29	-	壊死性
6	中心静脈注射	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	-	day1、15、29	-	-
8	中心静脈注射	5-FU注	400mg/m ²	-	day1、15、29	-	炎症性
9	中心静脈注射	5-FU注	2400mg/m ²	-	day1、15、29	-	炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day15	day22	day29
1	中心静脈注射	生理食塩液 100ml * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン	100ml	投与順1		投与順1	
2	中心静脈注射	ハーセプチン点滴静注用 注射用水 20ml 生理食塩液 250ml * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン	6mg/kg 必要量 250ml	投与順2		投与順2	
3	中心静脈注射	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:CVルートメイン	50ml	投与順3		投与順3	
4	中心静脈注射	プロイメンド点滴静注用150mg 生理食塩液 100ml 中心静脈注射: * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン	1V 100ml	投与順4	投与順1		投与順1
5	中心静脈注射	デキサート注射液1.65mg/0.5ml グラニセトロン点滴静注3mg/10 中心静脈注射: * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン	4A 1P	投与順5	投与順2		投与順2
6	中心静脈注射	レボホリナート点滴静注用 大塚糖液 5% 250ml 中心静脈注射: * 点滴時間2時間 エルブラットと同時に 投与経路:CVルートメイン側管	200mg/m ² 250ml	投与順6	投与順3		投与順3
7	中心静脈注射	エルブラット点滴静注液 大塚糖液 5% 250ml 中心静脈注射: * 点滴時間2時間 レボホリナートと同時に 投与経路:CVルートメイン	85mg/m ² 250ml	投与順7	投与順4		投与順4
8	中心静脈注射	5-FU注 生理食塩液 50ml 中心静脈注射: * 点滴時間5分 投与経路:CVルートメイン	400mg/m ² 50ml	投与順8	投与順5		投与順5
9	中心静脈注射	5-FU注 生理食塩液 中心静脈注射: * 点滴時間46時間 投与経路:CVルートメイン	2400mg/m ² 適宜	投与順9	投与順6		投与順6

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2、16、30	day3、17、31	day4、18、32
1	内服	デカドロン	4mg		4mg	4mg	4mg