

【肛門癌】

レジメン名称 : 5-FU+MMC+RT

インターバル日数 : 28 日

催吐リスク : 軽度

基準日: day1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
2	中心静脈注射	マイトマイシン注用	10mg/m ²	20mg/B	day1	-	壊死性
3	中心静脈注射	5-FU注	800mg/m ²		day1~4	-	炎症性
	放射線		1.8Gy/日		day1~5、8 ~12、15~ 19、22~26		

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5
1	中心静脈注射	デキサート注射液1.65mg/0.5ml グラニセトロン点滴静注3mg/100ml 中心静脈注射: *点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン	4A 1P	投与順1				
2	中心静脈注射	マイトマイシン注用 生理食塩液 50ml 中心静脈注射 *点滴時間5分 投与経路:CVルートメイン	10mg/m ² 50ml	投与順2				
3	中心静脈注射	5-FU注 生理食塩液 250ml 中心静脈注射 ※点滴時間24時間 投与経路:CVルートメイン	800mg/m ² 250ml	投与順3	投与順1	投与順1	投与順1	
4	中心静脈注射	生理食塩液 50ml 中心静脈注射 ※点滴時間5分 投与経路:CVルートメイン	50ml					投与順1