

【末梢性T細胞リンパ腫、ホジキンリンパ腫】

レジメン名称: アドセトリス

インターバル日数: 21日間 基準日: day1

催吐性リスク: 軽度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
4	点滴静注	アドセトリス点滴静注用	1.8mg/kg	180mg	day1	-	非炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1
2	点滴静注	デキサート注射液1.65mg ポララミン注5mg 生理食塩液 100ml * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	2A 1A 100ml	投与順2
3	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順3
4	点滴静注	アドセトリス点滴静注用 注射用水100ml 生理食塩液 100ml 1Vあたり注射用水10.5mlで溶解(5mg/ml) 158mg以上は生食250mlに変更(0.4~1.2mg/ml) * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1.8mg/kg 必要量 100ml	投与順4
5	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順5

★ 158mg以上(約88kg以上)では生食250mlに変更

★ 体重100kgを超える場合は100kgとして計算する