

【乳癌】

レジメン名称: フェスゴ+ドセタキセル(2回目以降)

インターバル日数: 21日間 基準日: day1

催吐性リスク: 軽度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
1	皮下注射	フェスゴ配合皮下注MA	ヘルツスマブ600mg + トラスツスマブ600mg/10ml	—	day1	—	非炎症性
3	点滴静注	ドセタキセル点滴静注	75mg/m ²	—	day1	—	壊死性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	皮下注射	フェスゴ配合皮下注MA 翼状針使用のため全量採取 5分以上かけて大腿部に皮下投与 皮下投与	10ml	投与順1
2	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	4A 100ml	投与順2
3	点滴静注	ドセタキセル点滴静注 大塚糖液 5% 250ml * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	75mg/m ² 250ml	投与順3
4	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順4

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4
1	内服	デカドロン	8mg	—	8mg	8mg	8mg