

【血液内科 悪性リンパ腫】

レジメン名称 : A+CHP

インターバル日数 : 21 日

21 日

吐性リスク : 高度

基準日 : day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
3	点滴静注	ドキシソルピシン塩酸塩注射液	50mg/m <sup>2</sup>		day1	-	壊死性	500mg/m <sup>2</sup>
4	点滴静注	注射用エンドキサン	750mg/m <sup>2</sup>		day1	-	炎症性	
8	点滴静注	アドセトリス点滴静注用	1.8mg/kg	180mg	day1	-	非炎症性	

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注 ※点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1
2	点滴静注	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100ml 点滴静注 *点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	100ml	投与順2
3	点滴静注	ドキシソルピシン塩酸塩注射液 生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50mg/m <sup>2</sup> 計50ml	投与順3
4	点滴静注	注射用エンドキサン 生理食塩液 500ml 点滴静注 ※点滴時間2時間 投与経路:末梢ルートメイン側管	750mg/m <sup>2</sup> 500ml	投与順4
5	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順5
6	静注	ボラミン注5mg ワンショットで 静注 投与経路:末梢ルートメイン側管	1A	投与順6
7	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順7
8	点滴静注	アドセトリス点滴静注用 注射用水100ml 生理食塩液 100ml 1Vあたり注射用水10.5mlで溶解(5mg/ml) 158mg以上は生食250mlに変更(0.4~1.2mg/ml) 点滴静注 *点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1.8mg/kg 必要量 100ml	投与順8
9	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 *点滴時間5分 側管投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順9

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5
1	内服	プレドニゾン錠5mg	100mg/body			day1~5	100mg/body	
2	内服	イメンドカプセル	125mg、80mg	125mg	80mg	80mg		

- ★ 158mg以上(約88kg以上)では生食250mlに変更
- ★ 体重100kgを超える場合は100kgとして計算する