

【悪性リンパ腫】

レジメン名称 : RB

催吐性リスク : 中等度

インターバル日数 : 28 日

基準日 : day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
4	点滴静注	トリアキシン点滴静注液	90mg/m ²		day1,2		炎症性	
8	点滴静注	リツキシマブBS点滴静注	375mg/m ²		day1		非炎症性	

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2
1	点滴静注	生理食塩液100ml ルートキープ 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路: 末梢ルートメイン	100ml	投与順1	投与順1
2	点滴静注	パロノセトロン静注0.75mg デキサート注射液1.65mg 生理食塩液100ml 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路: 末梢ルートメイン側管	1V 3A 100ml	投与順2	
3	点滴静注	デキサート注射液1.65mg 生理食塩液100ml 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路: 末梢ルートメイン側管	3A 100ml		投与順2
4	点滴静注	トリアキシン点滴静注液 生理食塩液 50ml 点滴静注 * 点滴時間10分 投与経路: 末梢ルートメイン側管	90mg/m ² 50ml	投与順3	投与順3
5	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 点滴時間5分 投与経路: 末梢ルートメイン側管	50ml	投与順4	投与順4
6	点滴静注	ボラミン注5mg/1ml 生理食塩液 50ml 点滴静注 点滴時間5分 投与経路: 末梢ルートメイン側管	1A 50ml	投与順5	
7	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注 ※点滴時間30分 投与経路: 末梢ルートメイン側管	100ml	投与順6	
8	点滴静注	リツキシマブBS点滴静注 生理食塩液 1000ml 10倍希釈になるように調製 点滴静注 ※点滴時間は主治医入力 投与経路: 末梢ルートメイン側管	375mg/m ² 10倍希釈になる量 (主治医入力)	投与順7	
9	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 点滴時間5分 投与経路: 末梢ルートメイン側管	50ml	投与順8	

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3
1	内服	イメンドカプセル	125mg、80mg	125mg	80mg	80mg