

【乳癌】

レジメン名称: パーージェタ+トラスツズマブ+ハラヴェン(2回目以降)

インターバル日数: 21日間 基準日: day1

催吐性リスク: 軽度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
2	点滴静注	パーージェタ点滴静注	420mg/body	—	day1	—	非炎症性
3	点滴静注	トラスツズマブBS点滴静注用	6mg/kg	—	day1	—	非炎症性
5	点滴静注	ハラヴェン	1.4mg/m <sup>2</sup>	—	day1.8	—	非炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8
1	点滴静注	生理食塩液 100ml * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1	投与順1
2	点滴静注	パーージェタ点滴静注 生理食塩液 250ml * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	420mg 250ml	投与順2	
3	点滴静注	トラスツズマブBS点滴静注用 注射用水 20ml 生理食塩液 250ml 150mg/Vは注射用水7.2ml、 60mg/Vは注射用水3mlで溶解(21mg/ml) * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	6mg/kg 必要量 250ml	投与順3	
4	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順4	
5	点滴静注	ハラヴェン静注 生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	1.4mg/m <sup>2</sup> 50ml	投与順5	投与順2
6	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順6	投与順3