

【乳癌】

レジメン名称: フェスゴ+ハラヴェン(2回目以降)

インターバル日数: 21日間 基準日: day1

催吐性リスク: 軽度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
1	皮下注射	フェスゴ配合皮下注MA	ヘルツスマブ [®] 600mg + トラスツスマブ [®] 600mg/10ml	—	day1	—	非炎症性
3	点滴静注	ハラヴェン	1.4mg/m ²	—	day1.8	—	非炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8
1	皮下注射	フェスゴ配合皮下注MA 翼状針使用のため全量採取 5分以上かけて大腿部に皮下投与 皮下投与	10ml	投与順1	
2	点滴静注	生理食塩液 100ml * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順2	投与順1
3	点滴静注	ハラヴェン静注 生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	1.4mg/m ² 50ml	投与順3	投与順2
4	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順4	投与順3