

【胃癌】

レジメン名称:FP+キイトルーダ維持  
 催吐性リスク:軽度

インターバル日数:21日 基準日:day 1

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
2	点滴静注	キイトルーダ点滴静注	200mg/body		day1	フィルター付き	非炎症性
5	点滴静注	5-FU	800mg/m <sup>2</sup>		day1~5		炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5	day6
1	点滴静注	生理食塩液 100ml * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1					
2	点滴静注	キイトルーダ点滴静注 生理食塩液 100ml * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	200mg 100ml	投与順2					
3	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順3					投与順1
4	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	4A 100ml	投与順4					
5	点滴静注	生理食塩液 500ml 5-FU 点滴静注: * 点滴時間24時間 投与経路:末梢ルートメイン	500ml 800mg/m <sup>2</sup>	投与順5	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1	