

【胃癌】

レジメン名称:エンハーツ(胃癌)

インターバル日数:21日間 基準日:day1

催吐性リスク:中等度

使用する抗癌剤:

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 | 投与 | ルート | 組織侵襲性 |
|----|------|------------|----------|-----|------|---------|-------|
| 3 | 点滴静注 | エンハーツ点滴静注用 | 6.4mg/kg | — | day1 | フィルター付き | 炎症性 |

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | day1 |
|----|------|---|--------------------------|------|
| 1 | 点滴静注 | パロノセトロン静注0.75mg/5ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン | 0.75mg 6A 100ml | 投与順1 |
| 2 | 点滴静注 | 5%糖液 100ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン | 50ml | 投与順2 |
| 3 | 点滴静注 | エンハーツ点滴静注用 注射用水20ml 5%糖液 100ml 遮光 100mgを5mlの注射用水で溶解(20mg/ml) * 点滴時間初回90分、2回目以降30分 投与経路:末梢ルートメイン | 6.4mg/kg 必要量 100ml | 投与順3 |
| 4 | 点滴静注 | 5%糖液 100ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン | 50ml | 投与順4 |

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | day1 | day2 | day3 |
|----|----|-------|-------|------|------|------|
| 1 | 内服 | デカドロン | 8mg | — | 8mg | 8mg |