

【乳癌】

レジメン名称:dose dense/パクリタキセル

インターバル日数:14日

基準日:day 1

催吐性リスク:軽度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
3	中心静脈注射	パクリタキセル注射用	175mg/m <sup>2</sup>	-	day1	PVCフリー/フィルター付き	壊死性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	中心静脈注射	デキサート注射液1.65mg/0.5ml ファモチジン静注20mg/20ml ポララミン注5mg/1ml 生理食塩液100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン	12A 1A 1A 100ml	投与順1
2	中心静脈注射	生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン	100ml	投与順2
3	中心静脈注射	パクリタキセル注射用 大塚糖液5% 500ml 点滴静注: * 点滴時間3時間 投与経路:CVルートメイン	175mg/m <sup>2</sup> 500ml	投与順3
4	中心静脈注射	生理食塩液50ml 点滴静注: * 点滴時間15分 投与経路:CVルートメイン	50ml	投与順4

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	
1	皮下注射	ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポット	3.6mg	day1もしくはday2