

【乳癌】

レジメン名称: 術前キイトルーダ<sup>®</sup>+パ<sup>®</sup>クリタキセル+カルボ<sup>®</sup>プラチン1週間毎  
 催吐性リスク: 中等度

インターバル日数: 21日

基準日: day 1

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
3	中心静脈注射	キイトルーダ点滴静注	200mg/body		day1	フィルター付き	非炎症性
7	中心静脈注射	パクリタキセル注	80mg/m <sup>2</sup>		day1、8、15	PVCフリー/フィルター付き	壊死性
8	中心静脈注射	カルボプラチン点滴静注	AUC1.5	225mg	day1、8、15		炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8	day15
1	中心静脈注射	生理食塩液 100ml ルートキープ用 * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン	100ml	投与順1	投与順1	投与順1
2	中心静脈注射	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:CVルートメイン側管	50ml	投与順2		
3	中心静脈注射	キイトルーダ点滴静注 生理食塩液 100ml * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン側管	200mg/body 100ml	投与順3		
4	中心静脈注射	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:CVルートメイン側管	50ml	投与順4		
5	中心静脈注射	デキサート注射液1.65mg/0.5ml ファモチジン静注20mg/20ml ポララミン注5mg/1ml アロカリス点滴静注235mg/10ml グラニセトロン点滴静注3mg/100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン側管	4A 1A 1A 1V 1P	投与順5	投与順2	投与順2
6	中心静脈注射	生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン側管	100ml	投与順6	投与順3	投与順3
7	中心静脈注射	パクリタキセル注 大塚糖液5% 250ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:CVルートメイン側管	80mg/m <sup>2</sup> 250ml	投与順7	投与順4	投与順4
8	中心静脈注射	カルボプラチン点滴静注 大塚糖液5% 250ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン側管	AUC1.5 250ml	投与順8	投与順5	投与順5
9	中心静脈注射	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:CVルートメイン側管	50ml	投与順9	投与順6	投与順6