

【乳癌】

レジメン名称: 術前キイトルーダ[®]+パ[®]クリタキセル+カルボ[®]プラチン3週間毎
 催吐性リスク: 中等度

インターバル日数: 21日

基準日: day 1

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
3	中心静脈注射	キイトルーダ点滴静注	200mg/body		day1	フィルター付き	非炎症性
8	中心静脈注射	パクリタキセル注	80mg/m ²		day1、8、15	PVCフリー/フィルター付き	壊死性
9	中心静脈注射	カルボプラチン点滴静注	AUC5	750mg	day1		炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8	day15
1	中心静脈注射	生理食塩液 100ml ルートキープ用 * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン	100ml	投与順1	投与順1	投与順1
2	中心静脈注射	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:CVルートメイン側管	50ml	投与順2		
3	中心静脈注射	キイトルーダ点滴静注 生理食塩液 100ml * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン側管	200mg/body 100ml	投与順3		
4	中心静脈注射	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:CVルートメイン側管	50ml	投与順4		
5	中心静脈注射	デキサート注射液1.65mg/0.5ml ファモチジン静注20mg/20ml ポララミン注5mg/1ml アロカリス点滴静注235mg/10ml グラニセロン点滴静注3mg/100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン側管	4A 1A 1A 1V 1P	投与順5		
6	中心静脈注射	デキサート注射液1.65mg/0.5ml ファモチジン静注20mg/20ml ポララミン注5mg/1ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン側管	4A 1A 1A 100ml		投与順2	投与順2
7	中心静脈注射	生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン側管	100ml	投与順6	投与順3	投与順3
8	中心静脈注射	パクリタキセル注 大塚糖液5% 250ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:CVルートメイン側管	80mg/m ² 250ml	投与順7	投与順4	投与順4
9	中心静脈注射	カルボプラチン点滴静注 大塚糖液5% 250ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン側管	AUC5 250ml	投与順8		
10	中心静脈注射	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:CVルートメイン側管	50ml	投与順9	投与順5	投与順5

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3
1	内服	デカドロン	4mg		4mg	4mg