

【急性骨髄性白血病】

レジメン名称 : DNR+AraC(AML地固め2)
 催吐性リスク : 中等度

インターバル日数 : 28 日
 基準日 : day 1

使用する抗がん剤:

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 | 投与 | ルート | 組織侵襲性 | 総投与量 |
|----|--------|------------|----------------------|-----|--------|-----|-------|---------|
| 2 | 中心静脈注射 | ダウノマイシン静注用 | 50mg/m ² | - | day1~3 | - | 壊死性 | 25mg/kg |
| 5 | 中心静脈注射 | キロサイド注 | 200mg/m ² | - | day1~5 | - | 非炎症性 | - |

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | day1 | day2 | day3 | day4 | day5 | day6 |
|----|--------|--|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | 中心静脈注射 | グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100ml 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路: CVメインルート | 1P | 投与順1 | 投与順1 | 投与順1 | 投与順1 | 投与順1 | |
| 2 | 中心静脈注射 | ダウノマイシン静注用 生理食塩液100ml 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路: CVメインルート | 50mg/m ² 100ml | 投与順2 | 投与順2 | 投与順2 | | | |
| 3 | 中心静脈注射 | 生理食塩液 50ml 点滴静注 * 点滴時間5分 投与経路: CVメインルート | 50ml | 投与順3 | 投与順3 | 投与順3 | | | |
| 4 | 中心静脈注射 | 生理食塩液 50ml 点滴静注 サブルート * 点滴時間5分 投与経路: CVサブルート | 50ml | 投与順4 | | | | | 投与順1 |
| 5 | 中心静脈注射 | キロサイド注 生理食塩液500ml 点滴静注 サブルート * 点滴時間24時間 投与経路: CVサブルート | 200mg/m ² 500ml | 投与順5 | 投与順4 | 投与順4 | 投与順2 | 投与順2 | |

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | day1 | day2 | day3 |
|----|----|----------|------------|-------|------|------|
| 1 | 内服 | イメンドカプセル | 125mg、80mg | 125mg | 80mg | 80mg |