

【非小細胞肺癌】

レジメン名称:カルボプラチン+パクリタキセル (AUC6)

インターバル日数:21日

基準日:day 1

催吐性リスク:中等度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
4	点滴静注	パクリタキセル注射用	200mg/m ²		day1	PVCフリー/フィルター付き	壊死性
5	点滴静注	カルボプラチン点滴静注	AUC6		day1		炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	点滴静注	プロイメンド点滴静注用150mg 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	1V 100ml	投与順1
2	点滴静注	グラニセトロン点滴静注3mg/100ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml ファモチジン静注20mg/20ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	1P 12A 1A	投与順2
3	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順3
4	点滴静注	パクリタキセル注射用 大塚糖液5% 500ml 点滴静注: * 点滴時間3時間 投与経路:末梢ルートメイン	200mg/m ² 500ml	投与順4
5	点滴静注	カルボプラチン点滴静注 大塚糖液5% 250ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	AUC6 250ml	投与順5
6	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順6

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3
1	内服	ポララミン錠	6mg	6mg		
2	内服	デカドロン錠	4mg		4mg	4mg