

## 【胃癌】

レジメン名称 : DCS  
 催吐リスク : 高度

インターバル日数 : 28 日  
 基準日 : day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
4	中心静脈注射	ドセタキセル点滴静注	40mg/m <sup>2</sup>		day 1	-	壊死性
7	中心静脈注射	シスプラチン点滴静注	70mg/m <sup>2</sup>		day 1	-	炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1		
2	点滴静注	アロカリス点滴静注235mg/10ml パロノセトロン静注0.75mg/5ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1V 1V 6A 100ml	投与順2		
3	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順3		
4	点滴静注	ドセタキセル点滴静注 生理食塩液 250ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	40mg/m <sup>2</sup> 250ml	投与順4		
5	点滴静注	アスパラギン酸カリウム注10mEq/10ml 硫酸Mg補正液1mEq/ml 20ml ソルデム1 500ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1A 0.4A 500ml	投与順5		
6	点滴静注	20%マンニトール300ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	200ml	投与順6		
7	点滴静注	シスプラチン点滴静注 生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間120分 投与経路:末梢ルートメイン側管	70mg/m <sup>2</sup> 計500ml	投与順7		
8	点滴静注	生理食塩液 500ml アスパラギン酸カリウム注10mEq/10ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	500ml 1A	投与順8		
9	点滴静注	ソルアセトF 500ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	500ml	投与順9	投与順1 メイン	投与順1 メイン
10	点滴静注	ソルアセトF 500ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	500ml	投与順10	投与順2 メイン	投与順2 メイン

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4
1	内服	デカドロン	8mg		8mg	8mg	8mg
2	内服	ティーエスワン	80mg/m <sup>2</sup>	day1~14			