

【胃癌】

レジメン名称: イリノテカン(胃癌)

インターバル日数: 28日

基準日: day 1

催吐性リスク: 中等度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
4	点滴静注	イリノテカン点滴静注	100mg/m <sup>2</sup>		day1.8.15	-	炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8	day15
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1	投与順1	投与順1
2	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml アロカリス点滴静注235mg/10ml グラニセトロン点滴静注3mg/100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	3A 1V 1P	投与順2	投与順2	投与順2
3	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順3	投与順3	投与順3
4	点滴静注	イリノテカン点滴静注 生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間90分 投与経路:末梢ルートメイン側管	100mg/m <sup>2</sup> 500ml	投与順4	投与順4	投与順4
5	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順5	投与順5	投与順5

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2,9,16	day3,10,17
2	内服	デカドロン	4mg		4mg	4mg