

【胃癌】

レジメン名称:SOX+キイトルーダ

インターバル日数:21日

基準日:day1

催吐性リスク:中程度

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
3	中心静脈注射	キイトルーダ点滴静注	200mg/body		day1	フィルター付き	非炎症性
7	中心静脈注射	エルプラット点滴静注液	100mg/m <sup>2</sup>		day1	-	壊死性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	中心静脈注射	生理食塩液 100ml ルートキープ用 * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン	100ml	投与順1
2	中心静脈注射	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:CVルートメイン側管	50ml	投与順2
3	中心静脈注射	キイトルーダ点滴静注 生理食塩液 100ml * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン側管	200mg/body 100ml	投与順3
4	中心静脈注射	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:CVルートメイン側管	50ml	投与順4
5	中心静脈注射	デキサート注射液1.65mg/0.5ml アロカリス点滴静注235mg/10ml グラニセロン点滴静注3mg/100ml 中心静脈注射: * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン側管	4A 1V 1P	投与順5
6	中心静脈注射	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:CVルートメイン側管	50ml	投与順6
7	中心静脈注射	エルプラット点滴静注液 大塚糖液 5% 250ml 中心静脈注射: * 点滴時間120分 投与経路:CVルートメイン側管	100mg/m <sup>2</sup> 250ml	投与順7
8	中心静脈注射	生理食塩液 50ml 中心静脈注射: * 点滴時間5分 投与経路:CVルートメイン側管	50ml	投与順8

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4
1	内服	デカドロン	4mg		4mg	4mg	4mg
2	内服	ティーエスワン	80mg/m <sup>2</sup>	day1~day14			