

【胃癌】

レジメン名称 : TS1+シスプラチンday1.8  
 催吐リスク : 高度

インターバル日数 35 日  
 基準日 : day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
4	点滴静注	シスプラチン点滴静注	30mg/m <sup>2</sup>		day1.8	-	炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1	投与順1
2	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml アロカリス点滴静注235mg/10ml パロノセトロン静注0.75mg/5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	6A 1V 1V 100ml	投与順2	投与順2
3	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順3	投与順3
4	点滴静注	シスプラチン点滴静注 生理食塩液500ml 点滴静注: ※点滴時間120分 投与経路:末梢ルートメイン側管	30mg/m <sup>2</sup> 500ml	投与順4	投与順4
5	点滴静注	ソルアセトF 500ml 点滴静注: ※点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	500ml	投与順5	投与順5

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1.8	day2.9	day3.10	day4.11
1	内服	デカドロン	8mg		8mg	8mg	8mg
2	内服	ティーエスワン	80mg/m <sup>2</sup>	day1~21			