

【胃癌】

レジメン名称 : TS1+シスプラチンday8 35日間隔
 催吐リスク : 高度

インターバル日数 35 日
 基準日: day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
6	点滴静注	シスプラチン点滴静注	60mg/m ²		day8	-	炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day8	day9	day10
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1		
2	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml アロカリス点滴静注235mg/10ml パノセトロン静注0.75mg/5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	6A 1V 1V 100ml	投与順2		
3	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順3		
4	点滴静注	アスパラギン酸カリウム注10mEq/10ml 硫酸Mg補正液1mEq/ml 20ml ソルデム1 500ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1A 0.4A 500ml	投与順4		
5	点滴静注	20%マンニトール300ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	200ml	投与順5		
6	点滴静注	シスプラチン点滴静注 生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間120分 投与経路:末梢ルートメイン側管	60mg/m ² 計500ml	投与順6		
7	点滴静注	生理食塩液 500ml アスパラギン酸カリウム注10mEq/10ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	500ml 1A	投与順7		
8	点滴静注	ソリアセトF 500ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	500ml	投与順8	投与順1 メイン	投与順1 メイン
9	点滴静注	ソリアセトF 500ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	500ml	投与順9	投与順2 メイン	投与順2 メイン

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day8	day9	day10	day11
1	内服	デカドロン	8mg		8mg	8mg	8mg
2	内服	ティーエスワン	80mg/m ²		day1~21		