

【胃癌】

レジメン名称: XELOX+ビロイ(初回)

インターバル日数: 21日

基準日: day 1

催吐性リスク: 高度

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
4	中心静脈注射	ビロイ点滴静注用	800mg/m ²	-	day1	フィルター付き	非炎症性
6	中心静脈注射	エルブラット点滴静注液	130mg/m ²	-	day1	-	壊死性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	中心静脈注射	生理食塩液 100ml ルートキープ用 中心静脈注射: * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン	100ml	投与順1
2	中心静脈注射	アロカリス点滴静注235mg/10ml パロノセトロン静注0.75mg/5ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml ポララミン注5mg 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン側管	1V 1V 6A 1A 100ml	投与順2
3	中心静脈注射	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:CVルートメイン側管	50ml	投与順3
4	中心静脈注射	ビロイ点滴静注用 注射用水 100ml 生理食塩液 1000ml 100mg/V/を注射用水5mlで溶解(20mg/ml) 投与経路:CVルートメイン側管	800mg/m ² 必要量 2mg/mlになる量	投与順4
5	中心静脈注射	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:CVルートメイン側管	50ml	投与順5
6	中心静脈注射	エルブラット点滴静注液 大塚糖液 5% 250ml 中心静脈注射: * 点滴時間120分 投与経路:CVルートメイン側管	130mg/m ² 250ml	投与順6
7	中心静脈注射	生理食塩液 50ml 中心静脈注射: * 点滴時間5分 投与経路:CVルートメイン側管	50ml	投与順7

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4
1	内服	デカドロン	8mg		8mg	8mg	8mg
2	内服	ゼローダ	2000mg/m ²	day1夕~day15朝			

★ビロイの投与速度

50ml/hr→100ml/hr→150ml/hr→200ml/hr 30分毎にUP、最大200ml/hr