

【食道癌】

レジメン名称 : low dose FP  
 嘔吐リスク : 高度

インターバル日数 : 7 日  
 基準日: day1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
8	中心静脈注射	5-FU注	250mg/m <sup>2</sup>		day1~7	-	炎症性
4,6	中心静脈注射	シスプラチン点滴静注	5mg/m <sup>2</sup>		day1~5	-	炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5	day6	day7
1	中心静脈注射	生理食塩液 100ml ルートキープ用 中心静脈注射 * 点滴時間30分 投与経路: CVルート	100ml	投与順1						
2	中心静脈注射	アロカリス点滴静注235mg/10ml パロノセトロン静注0.75mg/5ml デキササート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml 中心静脈注射 * 点滴時間30分 投与経路: CVルート	1V 1V 4A 100ml	投与順2						
3	中心静脈注射	生理食塩液 50ml 中心静脈注射 * 点滴時間5分 投与経路: CVルート	50ml	投与順3						
4	中心静脈注射	シスプラチン点滴静注 生理食塩液 500ml 中心静脈注射 * 点滴時間120分 投与経路: CVルート	5mg/m <sup>2</sup> 500ml	投与順4						
5	中心静脈注射	生理食塩液 50ml 中心静脈注射 * 点滴時間5分 投与経路: CVルート側管	50ml		投与順1	投与順1	投与順1	投与順1		
6	中心静脈注射	シスプラチン点滴静注 生理食塩液 500ml 中心静脈注射 ※点滴時間120分 投与経路: CVルート側管	5mg/m <sup>2</sup> 500ml		投与順2	投与順2	投与順2	投与順2		
7	中心静脈注射	生理食塩液 50ml 中心静脈注射 * 点滴時間5分 投与経路: CVルート側管	50ml		投与順3	投与順3	投与順3	投与順3		
8	中心静脈注射	5-FU注 生理食塩液 500ml 中心静脈注射 ※点滴時間24時間 投与経路: CVルート	250mg/m <sup>2</sup> 500ml	投与順5	投与順4	投与順4	投与順4	投与順4	投与順1	投与順1